



**Tordon™ 30,4 SL**

**HERBICIDA**

Experiencia, calidad y confianza



Visítenos en [corteva.com](http://corteva.com)

®, ™ Marca registrada de DuPont, Dow AgroSciences y Pioneer y marcas afiliadas a su respectivo dueño.

### ¿Qué es Tordon™ 30,4 SL?

Es un herbicida selectivo de Súper Ganadería™ de Corteva Agriscience™ para el control de maleza de hoja ancha en potreros, que generación tras generación ha demostrado su poder y eficacia.

### Beneficios

- Controla las principales malezas de hoja ancha presentes en sus potreros, permitiendo que obtenga más pasto.
- Herbicida para ser aplicado vía foliar sobre las malezas o en toconeo de arbustos.
- Herbicida formulado como Concentrado Soluble (SL).
- Versatilidad, controla un amplio espectro de malezas.

### LOS 8 PASOS DEL ÉXITO DE SÚPER GANADERÍA™ EN LA APLICACIÓN DE Tordon™ 30,4 SL



1 Identifique la maleza más importante en su potrero, use las dosis y métodos de aplicación recomendados por un Asesor o distribuidor si es necesario.



2 Utilice el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales o en manchoneo, no olvide usar equipo de protección.



3 Pastoree el potrero antes de aplicar el herbicida.



4 Prepare correctamente la mezcla, use el agua lo más limpia posible. Siempre utilice el equipo de protección adecuado: (guantes, overol, lentes de seguridad y botas).



5 Aplique Tordon™ 30,4 SL cuando la maleza esté creciendo vigorosamente. No aplique si la planta está en floración, fructificación o sequía.



6 Asegúrese que todas las partes queden bien aplicadas.



7 Aplique con buen clima, evite hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Trate de aplicar en las horas más frescas del día.



8 De tiempo a que el pasto se desarrolle y cubra áreas que ocupaban la maleza. Evite sobrepastorear los potreros.

### Recomendaciones de Uso en Pasturas

PAÍS	MALEZA	RECOMENDACIONES
El Salvador Honduras Costa Rica Panamá Belice Guatemala R. Dominicana	Espino blanco ( <i>Acacia farnesiana</i> )	Utilice una dosis de 2 - 4 L/ha (1,4 - 2,8 L/mz, cuando las malezas tengan de 3 a 4 hojas verdaderas. Utilizando de 200 - 400 L/ha (150 - 300 L/mz) de agua para aplicaciones terrestres y de 50 - 80 L/ha (38 - 60 L/mz) de caldo por aplicación de aérea.
	Cornisuelo ( <i>Acacia cornigera</i> )	
	Malva ( <i>Malva cristata</i> )	
	Víbora ( <i>Asclepias curassavica</i> )	
	Pie de venado ( <i>Bahuvia excava</i> )	
	Carboncillo ( <i>Calliandra spp.</i> )	
	Platanillo ( <i>Canna indica</i> )	
	Cafesillo ( <i>Caseaha javitensis</i> )	
	Frijolillo ( <i>Cassia tora</i> )	
	Escobilla ( <i>Sida acuta</i> )	
Chipilin de monte ( <i>Crotalaria retusa</i> )		
Golondrina ( <i>Euphorbia desinflora</i> )		



Categoría Toxicológica: II - Franja: Amarilla  
Teléfonos de Emergencia: **Guatemala:**(502) 2230-0807 - (502) 2232-0735 / **Honduras:** (504) 2232-2322 / **Nicaragua:** (505) 2289-4700 ext. 1294 - (505) 8755-0983 / **Costa Rica:** (506) 2223-1028 / **Panamá:** (507) 523-4948- (507) 523-4968 / **República Dominicana:** (809) 684-3478 / 3672 - (809) 681-7828.

Categoría Toxicológica: 5 - Franja: Verde  
**Belice:** (501) 231548 - (501) 231639 / **El Salvador:** : (503) 2231-9262  
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

PAIS	No. de Registro
Guatemala	479-14
Belice	0123 - 2M
El Salvador	95 - 05 - 228
Honduras	5-3-1
Nicaragua	DW- 01 - 2 - 97
Costa Rica	1017
Panamá	1775
Rep. Dominicana	11