

PORTAFOLIO SUPER GANADERÍA™



Soluciones en potreros

HERBICIDAS

- Flash™ 7,5 SL**
- Tronador™ 18,9 SL**
- Tordon™ 30,4 SL**
- Pastar™ 36 SL**
- Dominum™ 12 EO**

Tordon™ 30,4 SL: No. Registro 95-05-228 - Categoría Toxicológica 5 - Franja Verde / Tronador™ 18,9 SL: No. Registro AG2008040837 Categoría Toxicológica 4 - Franja Azul / Pastar™ 36 SL: No. Registro AG. 2006-10-803 - Categoría Toxicológica II - Franja Amarilla Flash™ 7,5 SL: No. Registro 93-06-95 - Categoría Toxicológica 5 - Franja Verde / Dominum™ 12 EO: No. Registro AG201070899 Categoría Toxicológica IV - Franja Verde
Teléfonos de emergencia: El Salvador: (503) 2231-9262

De generación en generación

Tordon™ 30,4 SL
HERBICIDA


Pastar™ 36 SL
HERBICIDA


Flash™ 7,5 SL
HERBICIDA
Acaba con las malezas, cuidando su bolsillo


Dominum™ 12 EO
HERBICIDA
No le de pasto a la maleza


Tronador™ 18,9 SL
HERBICIDA
Una alternativa inteligente


8 PASOS DEL ÉXITO DE SUPER GANADERÍA™


- 


Identifique las malezas ms abundantes en sus potreros, use las dosis y métodos de aplicación recomendados por un Asesor Técnico o un distribuidor de Corteva Agriscience™.
- 


Utilice el equipo de aplicación adecuado y en buen estado, ya sea para aplicaciones totales o en parches, y no olvide usar equipo de protección.
- 

Prepare correctamente la mezcla, use el agua lo más limpia posible. Siempre utilice el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad y botas).
- 

Pastorear el potrero antes de aplicar el herbicida.
- 

Aplique el producto cuando la maleza esté creciendo vigorosa -mente. No aplique si la planta está en floración, fructificación o sequía.
- 

Asegúrese que todas las partes de la maleza queden bien aplicadas.
- 

Aplique con buen clima, evite hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Trate de aplicar en las horas ms frescas del día.
- 

Espera a que el pasto se recupere y ocupe el espacio sobrepastorear los potreros.

PARA MALEZAS:

-  HERBÁCEAS
-  SEMILEÑOSAS
-  LEÑOSAS
-  ARBUSTIVAS



CORTEVA™
agriscience



Dominum™ 12 EO



Carrusel o Cinco negritos
Lantana camara

1 - 1,25 l/barril de 200 l de agua



Cornizuelo o Ixcanal
Acacia cornigera

0.5 - 0.75 % v/v
1 - 1,5 l/barril de 200 l de agua



Escoba o escobilla
Sida rhombifolia

1 - 1,25 l/barril de 200 l de agua
1.5-2.0 l/ha o 1-1.25 l/mz



Guayabito
Psidium guajava

2 l/barril de 200 l de agua
1.0 % v/v



Nance silvestre
Byrsonima

2 a 2.5 l/barril de 200 l de agua
1.0 - 1.25 % v/v.

Pastar™ 36 SL



Escobilla
Sida rhombifolia

Dosis de 2 a 2.5 l/barril de 200 l
2.5 - 3.25 l/ha o 2 - 2.5 l/mz



Sarza cola de iguana
Mimosa pudica

1% v/v ó 3-4 L/ha
(2.1-2.8 L/mz)



Espino blanco o Subin
Sida acuta

1% v/v ó 3-4 L/ha
(2.1-2.8 L/mz)



Subin o espino blanco
Acacia farnesiana

Dosis de 3 l/barril de 200 l
3.5 a 4 l/ha o 3 - 3.25 l/mz



Viborana
Asclepias curassavica

1.5 a 2 l/ barril de 200 l
2 a 2.5 l/ha o 1.5 a 2 l/barril de 200 l



Abejón
Cassia tora

1% v/v o 3 - 4 L/ha
(2.1 - 2.8 L/mz)

Tordon™ 30,4 SL



Mimosa pigra
Malva cristata

2 l /tonel de 200 l
2.5 a 3 l/ha o 2 a 2.5 l/mz



Pie de venado
Bahúinia excisa

2.5 l/tonel de 200 l
3/ lha o 2.5 l/mz



Frijolillo o mani
Cassia tora

2 a 2.5 l /tonel de 200 l
2.5 a 3.25 l/ha o 2.5 a 3 l /mz



Escobilla
Sida acuta

2.5 a 3 l /tonel de 200 l
3.25 a 4 l/ha o 2.5 a 3 l /mz

Tronador™ 18,9 SL



Flor amarilla
Baltimora recta & Melampodium sp.

2 a 2.5 l/tonel de 200 l
2.5 -3/ lha o 2 a 2.5 l/mz



Zarza
Mimosa pigra

2.5 l/tonel de 200 l
3/ lha o 2.5 l/mz



Abejón / quiebra platos
Cassia tora

6,00-12,00 L/ha
(4,2-8,4 L/ha)



Dormilona
Mimosa pudica

3,00-6,00 L/ha
(2,1-4,2 L/mz)



Jazmin de río o pegajosa
Cleome viscosa

2.5 l/tonel de 200 l
3/ lha o 2.5 l/mz

Flash™ 7,5 SL



Dormilona
(Mimosa pudica)

2 a 2.5 l/tonel de 200 l
2.5 -3/ lha o 2 a 2.5 l/mz

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:

Recomendaciones:
